





Dans la région de Cacheu,  
90% des jeunes palmiers à huile n'atteignent pas l'âge  
adulte et le taux de mortalité de l'espèce était de 15,97%  
en 2016. Plusieurs facteurs sont en cause.

**LOT 3**

**Les dynamiques de la palmeraie  
en Casamance et à Cacheu : état des lieux**





Dans la région de Cacheu, le développement spectaculaire de l'anacarde constitue une menace pour le développement et la survie des palmiers à huile car :

- 1/ Pour installer les vergers d'anacarde, les agriculteurs brûlent des arbres importants comme les palmiers à huile.
- 2/ Quand les anacardiens grandissent, leur ombre couvre les autres arbres, comme les palmiers, qui n'arrivent plus à grandir naturellement.
- 3/ Avant, il y avait des palmeraies collectives où tout le monde pouvait exploiter la ressource. Depuis le milieu des années 1980, à cause du développement important de la plantation du cajou pour sécuriser les terres, les palmeraies sont devenues privées. Depuis les années 2000, les palmeraies collectives n'existent presque plus.

**LOT 3**

**Les dynamiques de la palmeraie  
en Casamance et à Cacheu : état des lieux**





En Casamance, en partie du fait de l'exode rural, il y a de moins en moins de jeunes pour entretenir les palmeraies.

**LOT 3**

**Les dynamiques de la palmeraie  
en Casamance et à Cacheu : état des lieux**





Les mauvaises pratiques agricoles menacent aussi les palmeraies. C'est le cas des techniques de récolte du vin à Cacheu. En Basse-Casamance, ces techniques restent relativement durables et permettent de préserver l'arbre.

**LOT 3**

**Les dynamiques de la palmeraie  
en Casamance et à Cacheu : état des lieux**







Quand la pluviométrie baisse,  
qu'il y a de la sécheresse et une hausse de la salinité des sols,  
les palmeraies sont menacées. C'est le cas à Cacheu,  
en Basse et en Moyenne Casamance.

**LOT 3**

**Les dynamiques de la palmeraie  
en Casamance et à Cacheu : état des lieux**





Dans la région de Cacheu, le palmier à huile est l'arbre le plus utilisé pour construire les plafonds des maisons parce que d'autres espèces comme le rônier se font de plus en plus rares. Cette utilisation importante du palmier à huile pour la construction est dangereuse pour la survie de l'espèce.

**LOT 3**

**Les dynamiques de la palmeraie  
en Casamance et à Cacheu : état des lieux**