



# Élevage : un des piliers de l'économie rurale marqué par la concentration croissante de la propriété du cheptel

Il n'est pas possible de dresser ici une typologie complète et détaillée des différentes formes d'élevage que l'on rencontre dans les régions concernées. Tout au plus peut-on présenter trois grandes catégories, se différenciant essentiellement par le degré de mobilité, la composition (espèces, races et effectifs) des troupeaux et l'intensité en capital et travail (cf. tableau 8 ci-contre).

Une étude de la FAO conduite en 2002 suggère que le système transhumant représente près de 60% du cheptel national, avec des différences très nettes en fonction des espèces considérées (cf. tableau 9 ci-contre).

Le « **système embouche** » apparaît comme le plus intensif en travail et en capital. Il se rencontre dans l'ensemble des cinq régions. L'embouche ovine, qui domine largement, est le plus souvent le fait des femmes qui, pendant plusieurs mois (3 à 6 mois), engraisent des animaux (généralement une à deux têtes de mâle) en claustration ou au piquet. Le son de céréales (blé, sorgho, riz), la paille de sorgho, les fanes de légumineuses (arachide, niébé), les graines de niébé et de sorgho constituent la base de l'alimentation. Ces animaux peuvent faire l'objet d'un déparasitage intestinal de manière à améliorer le croît. Si ce système ne concerne probablement que des effectifs limités, son importance économique est significative pour les unités de production qui le pratiquent presque

Dénomination	Composition du troupeau	Alimentation	Mobilité	Intensité en travail	Intensité en capital	Statut du berger (le cas échéant)	Objectif
Embouche	Une à cinq têtes [O] [B] [C]	Paille, son de sorgho/blé, niébé, tourteaux d'arachide	Nulle	Importante	Moyenne	-	Vente
Elevage sédentaire	Plusieurs dizaines [B, O, C] [O, C]	Pâturages, paille, son de sorgho/blé	Limitée (aller-retour journalier)	Limitée	Limitée	Issu de la famille (jeune garçon)	Auto consommation (lait) Vente
Elevage transhumant	Plusieurs dizaines à plusieurs centaines [O, B, C] [O, C] [Cam, O, C]	Pâturages, paille de céréales	Importante De 25 à plus de 1 000 km	Limitée	Généralement limitée mais en voie d'intensification	Salarié (+/-) rémunération en nature	Capitalisation Vente

Tableau 8. Typologie simplifiée des différentes formes d'élevage se rencontrant dans le Sud-Est mauritanien  
O : Ovins, Cam : Camelins, B : Bovins, C : Caprins

	Rural		Urbain
	Système transhumant	Sédentaire et embouche	Sédentaire
Bovins	95%	5%	-
Camelins	99%	1%	-
Ovins	60%	40%	-
Caprins	18%	80%	2%

Tableau 9. Répartition du cheptel dans les différents systèmes d'élevage  
D'après étude FAO citée par Ould M'Khaitir et Bâ (2006)